

Zapalenie przyzębia



Dotyczy około 35% populacji. Zaczyna się stanem zapalnym dziąseł, jednak nie każde zapalenie dziąseł prowadzi do zapalenia przyzębia. Zapalenie przyzębia, jest chorobą spowodowaną przez bakterie atakujące zarówno dziąsła jak i tkanki utrzymujące zęby w kości, niszcząc je. Ta faza jest nieodwracalna.

Zapalenie przyzębia jest to kolejna faza po nieleczonym zapaleniu dziąseł. Jest to niebezpieczna choroba, która ma wpływ na ogólny stan zdrowia i powoduje utratę zębów.

TWOJE KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE NA ZAPALENIE PRZYŻĘBIA



PERIO-AID® INTENSIVE CARE

Faza ostra choroby

Kontrola patogenów przyzębia



Stosowanie od 2 do 4 tygodni



PERIO-AID® ACTIVE CONTROL

Faza kontrolna leczenie podtrzymujące

Kontrola - ryzyko nawrotu choroby



Stosowanie do 6 miesięcy



RATUNEK NA CHOROBY DZIĄSEŁ ZAPALENIE PRZYŻĘBIA

DENTAID
Oral Health Experts

www.dentaidpolska.pl

BIS BAŁTYCKI
INSTYTUT
STOMATOLOGII

Wyłączny dystrybutor:
www.sklep.dentaidpolska.pl



fb.me/BisDentaidPolska
instagram.com/dentaid_polska/

Leczenie PERIODONTOLOGICZNE

Przy leczeniu zapalenia przyzębia niezbędne jest kontrolowanie namnażania się bakterii powodujących chorobę.



W gabinecie stomatologicznym

Poprzez zabiegi periodontologiczne usuwające płytkę bakteryjną:

- Usuwanie kamienia nad i poddziąsłowego
- Zabiegi chirurgiczne



W domu

Stosowanie odpowiednich płukanek antyseptycznych, wspomagających działanie zabiegów stomatologicznych.

PERIO-AID®
INTENSIVE CARE

=

Chlorheksydyna
0,12%

+

Chlorek
Cetylpirydyny
0,05%

Wskazania:

- Pomocniczo w zapobieganiu stanom zapalnym dziąseł
- Przed i po zabiegach stomatologicznych
- W skutecznym zwalczaniu płytki nazębnej (biofilmu)
- Zaleca się pacjentom, którzy cierpią na dużą nadwrażliwość zębów, lub w innych sytuacjach, gdzie codzienna higiena jest utrudniona




**STOSOWAĆ OD
2 DO 4 TYGODNI**

TERAPIA PODTRZYMUJĄCA w chorobach przyzębia

Po zakończeniu właściwego leczenia nadal istnieje ryzyko nawrotu chorób przyzębia. Rozwój pozostających w jamie ustnej specyficznych bakterii powinien być nadal kontrolowany.

W fazie podtrzymującej leczenie, należy stosować płyn antybakteryjny o niskim stężeniu chlorheksydyny, aby uniknąć nawrotów choroby.

ZDROWE DZIAŚŁO



ZAPALENIE PRZYŻĘBIA



PERIO-AID®
ACTIVE CONTROL

=

Chlorheksydyna
0,12%

+

Chlorek
Cetylpirydyny
0,05%

Wskazania:

- Pomocniczo w zapobieganiu stanom zapalnym dziąseł
- Po zabiegach stomatologicznych
- W skutecznym zwalczaniu płytki nazębnej (biofilmu)



**STOSOWAĆ
DO 6 MIESIĘCY**